

Tytuł: Trichobezoar jako rzadka przyczyna niedrożności jelita cienkiego u dzieci - opis przypadku /
Trichobezoar as a rare cause of small intestine obstruction in children - a case report

Słowa kluczowe: DZIECKO LECZENIE OPERACYJNE NIEDROŻNOŚĆ JELITA CIENKIEGO
TRICHOBEZOAR

Keywords: CHILD SMALL INTESTINE OBSTRUCTION SURGICAL TREATMENT
TRICHOBEZOAR

Autorzy:

Krzysztof Przybylski - Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Łukasz Różycki - Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Kamil Koszela - Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Paweł Juszcak - Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Ludomir Nowak - Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Streszczenie:

Trichobezoar jest szczególnym typem ciała obcego przewodu pokarmowego powstającym najczęściej u pacjentów cechujących się trichotillomanią (przymus wrywania włosów) z towarzyszącą trichofagią (przymus zjadania włosów). Najczęściej występuje u młodych kobiet chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo (90% przypadków). Sporadycznie formuje się w przewodzie pokarmowym u dzieci. W zależności od wielkości i ich umiejscowienia mogą być przyczyną różnych dolegliwości oraz powikłań. Z uwagi na rzadkość występowania w populacji dziecięcej, trichobezoary powodują znaczne trudności diagnostyczne oraz terapeutyczne. W pracy autorzy przedstawiają przypadek 8-letniej dziewczynki z objawami niedrożności przewodu pokarmowego, których przyczyną był trichobezoar jelita cienkiego.

Abstract:

Trichobezoar is a special type of the foreign body, which is usually formed in the gastrointestinal tract of patients with trichotillomania (compulsive hair pulling) and concomitant trichophagia (compulsive eating of hair). Trichobezoars can usually be found in young women with mental disorders or intellectual disabilities (90% of cases). Occasionally they can be found in the gastrointestinal tract of children. Depending on the size and location, trichobezoars may cause different ailments and complications. Due to the rare occurrence of trichobezoars among children it is particularly difficult to diagnose and treat them.

This article presents a case of an 8-year-old girl with symptoms of gastrointestinal obstruction caused by a trichobezoar in the small intestine.