

Tytuł: Trądzik dziecięcy – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa. / Pediatric acne – clinical presentation and differential diagnosis.

Słowa kluczowe: TRĄDZIK POSPOLITY DZIECKO NOWORODEK NASTOLATEK NIEMOWL?

Keywords: ACNE VULGARIS NEWBORN INFANT CHILD ADOLESCENT

Autorzy:

Grażyna Chodorowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Joanna Bartosińska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie

Anna Michalak - Stoma - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie:

Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób skóry, szczególnie u młodzieży. Określenie trądzik dziecięcy dotyczy grupy wiekowej od urodzenia do 11 roku życia. W obrębie tej grupy wyróżniono 4 podgrupy: trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, trądzik wczesnodziecięcy oraz trądzik późnodziecięcy. Podział ten ma znaczenie ze względu na nieco różną etiologię, obraz kliniczny oraz leczenie w poszczególnych grupach wiekowych. W artykule zwracamy również uwagę na choroby u dzieci, w przebiegu których występują zmiany skórne przypominające wykwity trądzikowe, jak również na zaburzenia endokrynologiczne mogące wpływać na wystąpienie trądziku dziecięcego.

Abstract:

Acne vulgaris is one of the most common skin diseases, affecting especially adolescents. Pediatric acne is the term used to describe the presentation of this disease from birth through 11 years of age. Within the entity of pediatric acne, four subgroups were distinguished: neonatal acne, infantile acne, midchildhood acne, and preadolescent acne. This classification is important because of slightly different etiology, clinical presentation and treatment in the various age groups. In this paper we have also taken into consideration pediatric diseases with skin lesions similar to acne lesions, as well as endocrine disorders associated with pediatric acne.